藥物濫用宣導

猜猜我是誰？

藝人不自愛 大炳吸毒被抓
又哭又求饒

24小時戒毒成功專線0800-770-885(請請你-幫幫我)

猜猜我是誰？

裴琳出獄時臉上長滿痘痘

- 在演藝圈因演過多部偶像劇而小有知名度的裴琳，正值花樣年華，如今卻因為被警方查獲家中藏有大麻和吸食器而被逮捕，警方查出，她沒有吸毒前科，大麻的來源是來自於還沒有落網的藥頭所供應，同時，裴琳也坦承，她吸食毒品已經長達2、3個月了。

藥物濫用(Drug Abuse)

- 非基於醫療上需要而使用藥物
- 非依醫師處方而使用藥物
- 雖基於醫療上的需要，卻過量使用藥物
- 用藥程度到達傷害個人健康或到維害社區安全程度

成癮物質、管制藥物、毒品之關係

- 成癮物質
  - 泛指有成癮性的物質，包含合法與非法，如香菸、酒與海洛因、安非他命等毒品
- 管制藥品
  - 係指有成癮性麻醉藥品、影響精神藥品及其他認為有加強管理必要之藥品。並依其習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性之程度，分四級管理
- 毒品
  - 係指具成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品，並依其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級

藥物濫用者行為表徵

情緒方面

多話、躁動不安、沮喪、好辯、易怒、恍惚

身體方面

思睡、食慾不振、目光呆滯、無意義的反覆動作
結膜紅腫、步履不穩、靜脈炎

感官表達方面

視幻、幻聽、無方向感

社會適應方面

多疑、誇大、好鬥、無理性行為、缺乏動機
偷錢、鬼鬼祟祟、成績退步

濫用毒品的中毒臨床症狀

1.急性中毒臨床症狀：由昏迷、針瞳和呼吸抑制三種主要中毒臨床症狀。

2.耐藥性：長期使用嗎啡類化合物，對呼吸抑制、止痛、鎮靜、催吐和欣快效應等作用均有明顯的耐藥性。

3.依藥性：對生理及心理造成雙重性依賴，長期使用一旦中斷，會有生理上的脫癮症狀發生，此為生理依藥性所致。

濫用毒品的中毒臨床症狀

4.禁斷症狀:會出現流淚、鼻漏、呵欠、發汗等非意識，雞皮疙瘩、瞳孔放大、激動及震顫。

5.濫用合併症:濫用者常發生憂鬱、自殺等精神科合併症。

濫用毒品的可能因素

- 個人因素:好奇(96%)、解決挫折(58%)、尋找刺激(25%)、反抗權威(21%)、被忽視(18%)。
- 人格因素:情緒不穩、悲觀、無法忍受挫折、自我脆弱。
- 學校因素:課業壓力大適應不良、尋求團體及朋友認同、反抗權威。
- 家庭因素:破碎家庭、單親家庭、父母不和及管教不當、父母是酒癮或藥物濫用者。

何 謂 毒 品?

★具有成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品

★毒品依其成癮性、濫用性及對社會危害性分成四級。（毒品危害防制條例第2條）

毒品常見品項表-毒品危害防制條例

分級	第一級	第二級	第三級	第四級
常見毒品	▪ 海洛因 ▪ 嗎啡 ▪ 鴉片 ▪ 古柯鹼	▪ 安非他命 ▪ MDMA（搖頭丸） ▪ 大麻 ▪ LSD(搖腳丸 ▪ GHB(G水) ▪ PCP(天使塵 ▪ Psilocybin ▪ Psilocine ▪PMMA	▪ FM2 ▪ K他命 ▪ 2C-B ▪Nimetazepam (一粒眠、K5 、紅豆)	▪Zopiclone ▪Zolpidem (佐沛眠) ▪Mifepristone (RU-486) ▪Alprazolam (蝴蝶片) ▪Diazepam (安定、 煩寧) ▪Clobenzorex

為何要吸毒？

- 吸毒的壞處眾所皆知，但卻總是有人因為受不了誘惑而以身試法。
- 有的人是貪圖一時的快感，或者是受到好奇心的驅使，導致最後越陷越深、無法回頭的下場。
- 正因如此，毒品問題始終充斥台灣社會。

常見毒品種類

鴉片

海洛因

常見毒品種類



安非他命

搖頭丸

24小時戒毒成功專線0800-770-885(請請你-幫幫我)

常見毒品種類

液態快樂丸GHB

大麻

常見毒品種類

強力膠

K 他命

精神作用物質

- 依其對中樞系統作用的分類

中樞神經興奮劑	安非他命　MDMA (快樂丸) 古柯鹼
中樞神經抑制劑	鴉片類- 鴉片 嗎啡 海洛因 速賜康 巴比妥類- 青發 紅中 BZD類- FM2 Valium Halcion 一粒眠 其他類-Ketamine GHB 白板
幻覺劑	大麻　魔菇 PCP（天使塵）LSD（搖腳丸）
吸入性物質	強力膠　笑氣（N2O）

中樞神經興奮劑

古柯鹼 (Cocaine)

- 俗稱快克(Crack)

  經鼻吸食為常見之濫用方式

  主觀感覺欣快感、精力旺盛、注意力敏銳、思路清晰。

- 不良反應：產生視幻覺、觸幻覺、聽幻覺、感覺扭曲、多疑、猜忌、妄想等精神症狀。

中樞神經興奮劑

安非他命、甲基安非他命



- 使用者於初用時會有提神、振奮、欣快感、自信、滿足感等效果。
- 不良作用：

妄想型精神分裂症之安非他命精神病，症狀包括猜忌、多疑、妄想、情緒不穩、易怒、視幻覺、聽幻覺、觸幻覺及睡眠障礙等，也常伴有自殘、暴力攻擊行為等生理及心理依賴，停藥後產生戒斷症狀，包括疲倦、沮喪、焦慮、易怒、全身無力，嚴重者甚至出現自殺或暴力攻擊行為

中樞神經抑制劑

鴉片、嗎啡、海洛因

作用：

吸食後最典型之感覺為興奮及欣快感，具高度心理及生理依賴性無法集中精神，會產生夢幻現象。停藥會產生發抖、打冷顫、身體捲曲、抽筋等禁斷症狀。一旦成癮極難戒治，除產生戒斷反應外，心理的渴藥性是吸毒者最難克服的問題。

愷他命－Ketamine

檢出 Ketamine

管制藥品管理局

Ketamine（k－他命）



Capsules of Ketamine
Anonymous Photographer, © 2000 Erowid.org

Ketamine（k－他命）

- 作用：
  - 麻醉劑，使用後有身心解離的感覺（精神離開身體）、飄飄然、嚴重失定向感、逼真的夢及瞻妄。
- 副作用：
  - 呼吸抑制、意識改變並經歷”不同世界”即所謂解離、記憶力障礙、重複動作。

Ketamine Hydrocholoride
Photo by Zane, © 1999 Erowid

一粒砂（搖腳丸、LSD）

- 一種最強效且能改變情緒的化學物質。
- LSD使用者之體驗稱為迷幻之旅持續12小時左右，副作用稱為煉獄之旅，嚴重的脫離現實狀況，對時間及自我意識會改變，會聽到顏色、看到聲音…
- 極易產生抗藥性長時間使用會嚴重精神分裂或嚴重憂鬱

搖頭丸（MDMA）

- **濫用者若在擁擠、高溫的空間下狂歡勁舞，常會因運動過度導致缺水**，產生體溫過高（可高達43度）、痙攣，甚至併發肌肉損傷、凝血障礙及急性腎衰竭而導致死亡。。

檢出 **MDMA**

管制藥品管理局

綜合「危」他命

多重藥物濫用危機

檢出 MDA, Phencyclidine(PCP), PMMA, Ketamine, Caffeine

管制藥品管理局

FM_2 (俗稱約會強暴丸)

- 口服後三十分鐘可產生作用，二小時內達最高峰，藥效約可維持八小時
- 記憶力及判斷力減退、暫時性失憶症

FM2

- 無色 無味 易容於水
- 常被利用於性犯罪工具
  - 加入飲料不易察覺
  - 最近羅氏藥廠特別將製劑改為藍色，以提醒一般人加以留心飲料中是否有加藥
  - 新的FM2，加入白開水會變成藍色、柳橙汁會變成綠色，加入啤酒的話，則會產生綠色泡沫浮在表面。



吸膠的下場

強力膠本來是日常用品，雖未列入毒品危害防制條例管理，但適用社會秩序維護法第六十六條所指之吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品者，依法處三日以下拘留或新台幣一萬八千元以下罰鍰。有些人常誤以為吸食強力膠沒什麼大礙，但卻往往因此踏上吸食其他毒品的不歸路，付出慘痛的代價。

吸食強力膠引起之腦傷,致使四肢麻痺無力，無法吞嚥及呼吸困難。

毒癮者的隱形殺手—C型肝炎！

- 您可能瞭解靜脈毒癮者感染愛滋病的問題嚴重，但您可能不知道在台灣靜脈毒癮者C型肝炎（HCV）的感染亦相當嚴重。
- 國外研究報告顯示，在靜脈注射者中有41~84% 感染C型肝炎，而國內過去的研究，靜脈注射者C型肝炎感染率為67% ，但根據衛生署管制藥品管理局最新的委託學者專家研究顯示，此感染率已上升至88~91% 。

C型肝炎病毒主要傳染途徑

- C型肝炎病毒主要傳染途徑為注射行為、性行為與母體的垂直感染。
- 急性C型肝炎大部分沒有症狀，只有少部分有倦怠、茶色尿、或黃疸等肝炎症狀，然而將近八成都會變成慢性C型肝炎，持續慢性C型肝炎感染者常常是造成慢性肝炎、肝硬化和肝癌的危險因子。
- 為免C型肝炎成為健康的隱形殺手，我們呼籲大家千萬不要注射毒品。
- 已使用毒品者應接受病毒檢驗、主動就醫並接受定期追蹤。

毒品如何造成身體的傷害及永久的疤痕

吸毒者的肝臟

正常人的肝臟

吸食毒品慘不卒睹

0800-770-8

注射毒品感染愛滋



易感染愛滋等傳染性疾病

- 使用毒品會導致人體的免疫功能下降，使人容易患上肝炎、皮膚病等傳染性疾病，特別是共用注射器、靜脈注射毒品的危險行為，極易導致愛滋病的交叉感染

毒品人

如何減害、如何克制自己不要再度淪陷於毒品的魔掌？

習慣性的防衛想法

- 1. 否認：治療初期，不需要強迫逼病人認錯：強調清醒，而不在頓悟的引導。。
- 2. 全有-全無的想法：治療方式需較結構化及可預期性。
- 3. 衝突的降低與迴避
- 4. 以自我為中心的選擇性注意
- 5. 喜歡感性，討厭理性
- 6. 強迫性注意

問題在心中

- 外在的環境不是讓我們陷入痛苦的原因，是雜亂的心導致痛苦。
- 如何改變？培養觀察自己的能力。
  - 把自己當成觀察者，觀察自己的行為與思想，就能體會什麼是「平常心」，無關乎喜歡或不喜歡，想要或不想要。
  - 但，千萬不要墮入情境。心自然會流露本然的純淨。

什麼是減害(Harm reduction)

- 理念：務實策略，非贊成吸毒行為 。
- 以整體社會為出發點，兩害相權取其輕。
- 降低毒品對整個社會的傷害。
- 減害計畫(Harm reduction program)
  - 衛教宣導與篩檢諮商
  - 替代療法計畫
  - 清潔針具計畫

減害計畫 (Harm reduction)

實施對象：海洛因靜脈毒癮者

相關措施

- ❖替代療法
  - ❑美沙冬(二級管制藥品)
  - ❑丁基原啡因(三級管制藥品)
- ❖清潔針具交換計畫
  - ❑免費提供清潔針具
- ❖諮商及教育
  - ❑各縣市衛生局醫政課、疾管課、藥政課、衛生所
  - ❑醫院、衛生署、管管局、藥局

替代療法計畫

★什麼是美沙冬?

它是一種類鴨片藥物，為天然合成的化合物，其化學構造類似嗎啡、可待因等。被歸類為減緩中樞神經系統作用的鎮靜劑。

用來作為治療鴉片類成癮毒品患者

替代療法戒癮機構



美沙冬替代療法
社區外展服務點

24小時戒毒成功專線0800-770-885(請請你-幫幫我)

美沙冬戒癮流程

戒癮醫院

↓

精神科門診掛號

↓

攜帶雙證件報到

↓

進行相關檢驗、評估

可以 ↓ 開始接受替代療法

不可以 ↓ 轉介其他科別

清潔針具計畫

清潔針具交換據點

針具自動販賣機

放置地點：雲林縣鄉鎮市衛生所

投入10元※※※一個盒子

1. 2支針具
2. 2cc稀釋液
3. 2個保險套
4. 1份酒精棉片
5. 1份單張

清潔針具計畫衛材包內容物

清潔針具計畫執行點宣導卡

地點	電話	地址	服務時間	篩
奇美醫院	06-281-2811#53170	台南縣永康市中華路901號	8:00-17:30	✚
永康榮民醫院	06-236-5101#2203	台南縣永康市復興路427號	8:00-17:30	✚
[illegible]藥局	06-232-7271	台南縣永康市[illegible]190號	8:00-17:30	
[illegible]藥局	06-243-0733	台南縣永康市中正南路817號1樓	8:00-17:30	
[illegible]藥局	06-203-1203	台南縣永康市中華路597號	8:00-17:30	
永康藥局	06-254-8606	台南縣永康市中華路988-1號	8:00-17:30	
永康藥局中華店	06-302-2950	台南縣永康市中華路699號	9:00-01:00	
安安藥局	06-273-8102	台南縣永康市大灣路834號	8:00-17:30	
[illegible]藥局	06-201-6345	台南縣永康市大橋二街103號	8:00-17:30	
永大藥局	06-203-3330	台南縣永康市永大路3段189號	8:00-17:30	

諮詢機構

- 愛滋病防治：衛生署疾病管制局
  愛滋病免費諮詢專線0800-888-995　愛滋虛擬博物館http://aids.cdc.gov.tw
- 藥癮戒治：衛生署醫事處 (02)2321-0151
- 藥物濫用防制：衛生署管制藥品管理局 (02)2397-5006分機2121
  http://www.nbcd.gov.tw
- 宗教戒治轉介機構：基督教晨曦會 (02)2231-7744
  台灣基督教主愛之家 (03)826-0360
  基督教沐恩之家 (07)723-0595

藥癮者如何避免愛滋病

- 第1招～不要用毒，馬上戒毒
- 第2招～不要使用「注射類」的毒品
- 第3招～不要共用針具和溶液
- 第4招～消毒針具
- 第5招～一定要戴保險套

http://aids.cdc.gov.tw

藥癮者諮詢服務中心

各地藥癮者諮詢服務中心提供您愛滋病衛教資料、清潔針具及衛材、轉介醫療或其他專業單位三項服務，另有部分諮詢服務中心提供相關電話諮詢及愛滋病匿名抽血篩檢（✚）。

地點	電話	地址	服務時間	篩
台北市立聯合醫院 昆明院區	0968-955-892	台北市萬華區昆明街100號	9:00-17:00	✚
松德院區	02-2375-6135	台北市信義區松德路309號	9:00-17:00	
大昌藥局	02-2331-8966	台北市萬華區昆明街96巷10號	9:00-21:00	
[illegible]藥局	02-2307-4263	台北市萬華區[illegible]171號1樓	9:00-21:00	
[illegible]藥局	02-2337-5676	台北市萬華區[illegible]165號	9:00-21:00	
[illegible]藥局	02-2812-8296	台北市士林區[illegible]6段61號	9:00-21:00	
[illegible]藥局	02-2389-0919	台北市中正區[illegible]22號1.2樓	9:00-21:00	
[illegible]藥局	02-2368-9200	台北市文山區[illegible]3段113號	9:00-21:00	
[illegible]藥局	02-8676-8808	台北縣三峽鎮介壽路3段51號	8:00-22:30	
大和藥局	02-2671-1010	台北縣三峽鎮民生街150號	8:00-22:30	
[illegible]藥局	02-2673-6186	台北縣三峽鎮大同路27之1號1樓	9:00-22:30	
[illegible]藥局	02-2673-9797	台北縣三峽鎮民生街49號	9:00-23:00	
[illegible]藥局	02-2679-9044	台北縣鶯歌鎮鶯桃路483號	7:00-24:00	
[illegible]藥局	02-2670-9668	台北縣鶯歌鎮鶯桃路2段31號1樓	9:00-24:00	
[illegible]藥局	02-2679-1791	台北縣鶯歌鎮[illegible]179號	8:00-22:00	
[illegible]藥局	02-2670-5858	台北縣鶯歌鎮鶯桃路137號	8:00-23:00	
台南縣新營市衛生所	06-632-9421	台南縣新營市三民路72號	8:00-17:30	✚
衛生署新營醫院	06-635-1131#1501	台南縣新營市信義街73號	8:00-17:30	✚

地點	電話	地址	服務時間	篩
[illegible]安藥局	06-635-1678	台南縣新營市成功路10-12號	8:00-17:30	
人生藥局	06-632-2458	台南縣新營市中山路249號	8:00-17:30	
新泰安藥局	06-652-1293	台南縣鹽水鎮[illegible]7號	8:00-17:30	
台南縣鹽水鎮衛生所	06-652-1041	台南縣鹽水鎮大同路1號	8:00-17:30	✚
台南縣白河鎮衛生所	06-685-2014	台南縣白河鎮國光路5號	8:00-17:30	✚
[illegible]藥局	06-683-1128	台南縣白河鎮中正路55號	8:00-22:00	
台南縣麻豆鎮衛生所	06-572-2215	台南縣麻豆鎮[illegible]11-1號	8:00-17:30	✚
新樓醫院麻豆分院	06-570-2228#2100	台南縣麻豆鎮小埤里苓子林20號	8:00-17:30	✚
安安藥局	06-572-7475	台南縣麻豆鎮信義路12-14號	8:00-17:30	
台南縣佳里鎮衛生所	06-722-4106	台南縣佳里鎮進學路159號	8:00-17:30	✚
佳里綜合醫院	06-726-3333#3606	台南縣佳里鎮興化里606號	8:00-17:30	✚
[illegible]藥局	06-722-1447	台南縣佳里鎮文化路207號	8:00-17:30	
[illegible]藥局	06-721-1335	台南縣佳里鎮中山路272號	8:00-17:30	
台南縣新化鎮衛生所	06-590-6025	台南縣新化鎮健康路143號	8:00-17:30	✚
衛生署台南醫院新化分院	06-591-1929#3002	台南縣新化鎮[illegible]72號	8:00-17:30	✚
台南縣善化鎮衛生所	06-583-7035	台南縣善化鎮中山路200號	8:00-17:30	✚
台南縣學甲鎮衛生所	06-783-3359	台南縣學甲鎮建國路38號	8:00-17:30	✚
台南縣柳營鄉衛生所	06-622-6703	台南縣柳營鄉士林村54-5號	8:00-17:30	✚
奇美醫院柳營分院	06-622-6999#77501	台南縣柳營鄉太康村201號	8:00-17:30	✚
台南縣後壁鄉衛生所	06-687-2624	台南縣後壁鄉後壁村3號	8:00-17:30	✚
台南縣東山鄉衛生所	06-680-2618	台南縣東山鄉東山村236號	8:00-17:30	✚
台南縣下營鄉衛生所	06-689-2149	台南縣下營鄉中山路2段137號	8:00-17:30	✚

地點	電話	地址	服務時間	篩
台南縣六甲鄉衛生所	06-698-2013	台南縣六甲鄉中華路110號	8:00-17:30	✚
竹林大藥局	06-698-2258	台南縣六甲鄉民生街158號	8:00-17:30	
[illegible]藥局	06-698-6868	台南縣六甲鄉中山路7號	8:00-17:30	
台南縣官田鄉衛生所	06-579-1493	台南縣官田鄉隆田村中山路1段128號	8:00-17:30	✚
台南縣大內鄉衛生所	06-576-1044	台南縣大內鄉大內村2號	8:00-17:30	✚
台南縣西港鄉衛生所	06-795-2338	台南縣西港鄉西港村中山路368號	8:00-17:30	✚
台南縣七股鄉衛生所	06-787-2277	台南縣七股鄉大埕村379號	8:00-17:30	✚
台南縣將軍鄉衛生所	06-794-2007	台南縣將軍鄉[illegible]村185-6號	8:00-17:30	✚
台南縣北門鄉衛生所	06-786-2910	台南縣北門鄉[illegible]村[illegible]50號	8:00-17:30	✚
衛生署新營醫院北門分院	06-786-2410	台南縣北門鄉中樞村56-3號	8:00-17:30	✚
台南縣新市鄉衛生所	06-599-2504	台南縣新市鄉中興街12號	8:00-17:30	✚
台南縣安定鄉衛生所	06-592-2022	台南縣安定鄉安定村59-1號	8:00-17:30	✚
[illegible]藥局	06-501-4868	台南縣安定鄉港口村251之33號	8:00-17:30	
台南縣山上鄉衛生所	06-578-1013	台南縣山上鄉山上村201-15號	8:00-17:30	✚
台南縣玉井鄉衛生所	06-574-2276	台南縣玉井鄉中正路5號	8:00-17:30	✚
[illegible]藥局	06-574-3036	台南縣玉井鄉中正路238號	8:00-17:30	
台南縣楠西鄉衛生所	06-575-1006	台南縣楠西鄉中正路226號	8:00-17:30	✚
台南縣南化鄉衛生所	06-577-1139	台南縣南化鄉南化村226-1號	8:00-17:30	✚
台南縣左鎮鄉衛生所	06-573-1114	台南縣左鎮鄉中正村172-15號	8:00-17:30	✚
台南縣仁德鄉衛生所	06-270-4153	台南縣仁德鄉中山路606號	8:00-17:30	✚
衛生署嘉南療養院	06-279-5019#1076	台南縣仁德鄉中山路870巷80號	8:00-17:30	✚
台南縣歸仁鄉衛生所	06-239-3309	台南縣歸仁鄉中正北路1段1號	8:00-17:30	✚

搖頭族 毒癮者 是愛滋高危險群

- 共用針頭
  - —愛滋病、B或C型肝炎等傳染性疾病
  - —細菌性感染
- 服用毒品後心神失常狀況下，複雜而沒有保護措施的性行為。
- 發病後的症狀

24小時戒毒成功專線0800-770-885(請請你-幫幫我)

性病－愛滋病（AIDS）

- 愛滋病毒會侵犯人類的免疫系統，使人失去抵抗疾病的能力，產生許多感染症狀，統稱為後天免疫缺乏症候群。
- 傳染途徑：
  - 血液接觸。
  - 性交接觸。
  - 母子垂直感染。
- 行政院衛生署2008年7月發布的統計資料：台灣異性戀間性行為傳染愛滋病－約24.54% 。（愛滋病早已不是同性戀者的專利）

台灣歷年HIV感染者數依危險因素統計(73-94.12)



戒癮的八正道

- 正見、正思惟：正確的毒品認知與處理壓力的方式
- 正語、正業、正命：選擇不傷害別人的生活方式
- 正精進：持續努力的用上述方法來抵抗毒品的誘惑
- 正念、正定：完全改變舊有的習慣而有信心從現在的生活獲得滿足

珍惜自己的生命，愛惜身邊的親人，勇敢向毒品說『不』！

無毒大丈夫

- 學習正向的問題解決技巧
- 建立自信及自尊心
- 建立紓緩壓力，情緒的正當方法
- 遠離是非場所
- 提高警覺性，不隨意接受陌生人的飲料、香菸
- 培養健康休閒活動
- 善用好奇心，不要以身試毒

關心您的親友



藥物濫用者的行為表徵有哪些？

一、行為舉止明顯變化

常無理由的外出不歸　神秘兮兮、鬼鬼祟祟
常向家長親友要錢或借錢　對熟人迴避　突然換新朋友
結交一些行爲怪異的朋友　經常逃家逃學　作息顛倒
經常表示生病或頻頻到藥房買藥，卻又刻意隱藏某些藥物。
手臂有注射針孔痕跡，爲了掩飾針孔而不分季節穿長袖衣褲。

二、健康日益惡化

經常倦怠　在身上抓癢　皮膚有紅斑疹　皮膚潰爛
眼睛發紅　身體有異味　反胃嘔吐　食慾不振
目光呆滯　眼神經常渙散

三、情緒漸趨不穩定

對周遭人事物失去關心、多疑、一般反應能力差
吸打興奮劑後精神亢進興奮，藥效過後呈頹喪、焦躁不安。
施打麻醉劑後有安樂感，呈陶醉狀態，藥效過後呈疲乏情緒混亂。
變得經常易怒，但在某些時候（通常在吸毒之後），卻又突然變得相當愉快或對什麼事都不在乎。

做健康的選擇
小心快樂捷徑!